



Tatabánya, Turul u. 11.
Ortopédia, Dr.Hibbey Csaba
www.gyogyaszok-tatabanya.hu



Nyilatkozat tájékoztatásról

Alulírott tanúsítom, hogy engem (vagy korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg esetén a törvényes képviselőt) kezelőorvosom teljes körben felvilágosított betegségemről, mely kórisme szerint:

.....

Teljes körű felvilágosítást kaptam továbbá az alternatív, nem műtéti gyógymódról, mely:

.....

A fentieket a szóbeli tájékoztatás és a mellékelt tájékoztató és nyilatkozat elejétől a végéig való átolvasása után megértettem, ha kérdésem maradt, azt a kezelő személyzettel, a felvilágosítást végző orvossal tisztáztam.

Dátum:

.....

Dr.Hibbey Csaba

.....
a beteg vagy törv. képviselőjének aláírása

.....

tanú

tanú

Nyilatkozat műtéti beleegyezésről

Fent nevezett (a Nyilatkozat Tájékoztatásról rovatban) kérem, hogy a **szóbeli és írásbeli** tájékoztatás után rajtam (vagy korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg esetén a törvényes képviseltemen) az alábbi beavatkozást végezzék el:

.....

Dátum:

.....

Dr.Hibbey Csaba

.....
a beteg vagy törv. képviselőjének aláírása

Tájékoztató műtéti beavatkozásról

Műtétet azért javasoljuk, mert elvégzése esetén **nagyobb az esély** arra, hogy gyógyulása egyrészt rövidebb ideig tart, másrészt utána kevesebb panasz, fájdalom jelentkezik és jobb funkció várható, mintha a műtét helyett konzervatív kezelést alkalmazunk.

A konzervatív (műtét nélküli) kezelés közben is felléphet szövődmény, a várható végeredmény pedig várhatóan rosszabb lenne.

A javasolt gyógy mód kockázatokkal jár, úgymint:

Gyakoribb szövődményi lehetőségek (előfordulási gyakoriságuk 1-5 % körüli, függően a műtét nagyságától, kiterjedtségétől, hosszától):

- ízületi mozgások beszűkülése
- izomsorvadás és/vagy izomgyengeség
- vérgyülem kialakulása a műtéti és/vagy a sérülés területe körül
- a műtéti seb és/vagy a sérülés és környezetének gyulladása, váladékozása, mely lehet időleges vagy végleges és a műtét eredményét veszélyeztetheti
- a műtéti terület és/vagy a sérülés környezetében haladó idegek károsodása miatt hónapokig tartó vagy végleges érzés- vagy mozgászavar a műtéti terület és/vagy sérülés környezetében. Előfordulhat, hogy a gyógyulás során az idegek nyomás alá kerülnek, mely hónapokig (gyakran 6 hónapig) tartó mozgás és érzészavart eredményezhet.
- a műtéti területben futó nagyobb erek sérülésének (komoly, akár életet is veszélyeztető vérzés) veszélye, esetleg a végtag elvesztése (amputációja)
- elhúzódó csontgyógyulás vagy állízület kialakulása
- túlburjánzó, keloidos hegesezés, a seb másodlagos gyógyulása
- nemkívánatos szöveti reakció a beültetett anyagok, varratok környezetében
- a beültetett fémanyagok lazulása, törése, a beültetett fémanyagok elmozdulása (mely az esetek egy részében normál jelenség a törések zömülése során) és annak következményei
- felfekvés kialakulása
- tüdőgyulladás, felső légúti hurut kialakulása
- húgyúti fertőzés, elsősorban katéterezés után
- thrombosis - többnyire az alsó végtagokban vérrög (thrombus) képződhet, mely egyes esetekben nagyfokú, olykor maradandó végtag megvastagodással, keringési zavarral járhat, akár megelőző gyógyszeres kezelés ellenére is. A vérrög elszabadulása a tüdőben akár halálos kimenetelű elzáródást is okozhat (tüdőembólia).
- legtökéletesebb technikával végzett műtéti beavatkozás sem szünteti meg minden esetben a beteg minden panaszát, maradhat műtét után is fájdalom, duzzanat, mozgásbeszűkülés. Műtétet azért javasolunk, mert anélkül nagyobb valószínűséggel várható rosszabb végeredmény, mint a műtét elvégzése után.
- műtét illetve végtagi rögzítés (gipsz vagy brace) után előfordulhat keringészavar és a csontok foltos felritkulása (Sudeck szindróma), mely az utókezelést megnyújtja és nagyobb esélyt ad maradványtünetek kialakulására, fennmaradására

Aláírás:

- a végtagműtétek egy részét a vérkeringés kirekesztésével, vértelenységben kell végezni. A vértelenítő mandzsetta – annak ellenére, hogy nyomását a műtét során nyomásmérő segítségével állandóan ellenőrizzük – váratlan nyomásemelkedéskor az idegek nyomásos károsodását okozhatja. Ez átmeneti vagy tartós, részleges vagy teljes mozgás- és érzéskiesési tünetekben nyilvánulhat meg, de ezek a panaszok az esetek túlnyomó többségében rendeződnek.

Vannak tényezők, melyek **szövődmények kialakulásának valószínűséget fokozzák**, vagy jelentősen fokozzák. Ilyen tényezők:

- lágyrészsérülések (zúzódások, szakadások, roncsolódások) elsősorban a gyulladás és a hegesedéssel való gyógyulás miatti letapadások okozta mozgásbeszűkülés valószínűségét fokozzák
- ízületközeli törés a letapadás, mozgásbeszűkülés valószínűségét fokozza
- a törés a mozgásbeszűkülés, izomkárosodás, végtaghossz különbség, fémlazulás, illetve implantátum törés eshetőségét fokozza
- több csont együttes törése esetén nagyobb az esély mozgásbeszűkülésre, a kiterjedtebb lágyrészkárosodás miatt gyulladásra, hegesedésre
- érsérülés, keringésszavar esetén kifejezetten magasabb a mozgásbeszűkülés, izomsorvadás és gyengeség, csontgyógyulási zavar lehetősége
- helyi vagy általános csontritkulás esetén kifejezetten nagyobb az esély fémlazulásra, elmozdulásra, fémtörésre és a csonttörés elmozdulására, mozgásbeszűkülésre
- a bőr és bőralatti szövetek zúzódása, horzsolása, sebe, gyulladása és nyílt törés esetén lényegesen nagyobb az esély gyulladás, váladékozás kialakulására
- rossz általános állapot, gyenge szervezet, lassú mobilizálhatóság esetén a felfekvés, tüdőgyulladás, húgyúti fertőzés gyakori
- a beteg alap- és társbetegségei mindegyik szövődmény kialakulásának esélyét fokozhatják
- nem friss törés esetén a gyulladás, a mozgásbeszűkülés, a fémlazulások és a csontgyógyulási zavarok valószínűsége fokozódik
- reoperáció (ismételt műtét a korábban operált területen) esetén szintén fokozott a duzzanat, az ér- vagy idegsérülés, a sebggyulladás, a fémlazulás esélye

A leg gondosabb ellátás során is néhány százalék gyakorisággal szövődmények biztosan fellépnek. Bármilyen szövődmény jelentkezése esetén újabb műtéti beavatkozás(ok) válhatnak szükségessé ahhoz, hogy minél kevesebb maradandó károsodás alakuljon ki. A szövődmények fellépte esetén azonban maradandó károsodás valószínűsége ugrásszerűen megnő.

Tudomásul veszem, hogy **jogom van** a felajánlott kezelések bármelyikének elutasítására, illetve a beleegyezés visszavonására. Ebben az esetben a kezelésem során az elutasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért illetve a gyógyeredmény alakulásáért az orvosokat, akiknek kezelését nem fogadtam el, nem tehetem felelőssé, a felelősség alól felmentem.

Betegségemmel, eddigi kezelésemmel kapcsolatban információt nem hallgattam el.

Aláírás: